

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «_____» _____ 201__ г.
№ _____

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
ФИЛЬТРУМ®**

Торговое название

Фильтрум®

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

Одна таблетка содержит:

активное вещество:

лигнин гидролизный (в пересчете на 100 % вещество) – 400.00 мг;

вспомогательные вещества: повидон К 17 (поливинилпирролидон) –

54.66 мг, тальк – 13.00 мг, кальция стеарат – 9.75 мг, кремния диоксид коллоидный – 6.50 мг, кроскармеллоза натрия – 6.50 мг, целлюлоза микрокристаллическая до получения таблетки массой 600.00 мг.

Описание

Капсуловидные двояковыпуклые таблетки темно-коричневого цвета с вкраплениями от серого до коричневого цвета с риской.

Фармакотерапевтическая группа

Пищеварительный тракт и обмен веществ. Противодиарейные препараты. Кишечные адсорбенты. Прочие кишечные адсорбенты.

Код АТХ: А07ВС.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Лигнин не всасывается в желудочно-кишечном тракте, полностью выводится из кишечника в течение 24 ч.

Фармакодинамика

Фильтрум® – природный энтеросорбент, состоящий из продуктов гидролиза компонентов древесины – полимера лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропана и гидроцеллюлозы.

Обладает высокой сорбирующей активностью и неспецифическим дезинтоксикационным действием.

Связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, ответственных за развитие эндогенного токсикоза.

Показания к применению

- острые отравления лекарственными препаратами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем;
- пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия (в составе комплексной терапии);
- гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
- гипербилирубинемия и гиперазотемия (печеночная и почечная недостаточность);
- пищевая и лекарственная аллергия;
- профилактика хронических интоксикаций у работников вредных производств.

Способ применения и дозы

В качестве дезинтоксикационного средства у взрослых и детей с 0 месяцев при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения. Внутрь, детям до 6 лет – предварительно измельчить и растворить в 5-10 мл воды очищенной за час до еды и приема других лекарственных средств.

Доза препарата зависит от возраста, массы тела и тяжести заболевания, средняя разовая доза составляет для детей от 0 мес. до 6 мес. – ¼ таблетки 3 раза в день; от 6 мес до 1 года – ½ таблетки 3 раза в день; 1-3 года – ½-1 таблетка 3 раза в день; 4-7 лет – 1 таблетка 3-4 раза в день; 7-12 лет – 1-2 таблетки 3-4 раза в день; для взрослых – 2-3 таблетки 3-4 раза в день.

Длительность лечения при острых состояниях 3-5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях до 14-21 дней. Повторные курсы должны проводиться только по рекомендации врача.

Побочные действия

Редко:

- аллергические реакции;
- запор;
- нарушение всасывания витаминов, кальция.

Противопоказания

- индивидуальная непереносимость препарата;
- обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атония кишечника.

Лекарственные взаимодействия

Возможно, снижение лечебного эффекта некоторых одновременно принимаемых внутрь препаратов.

Особые указания

Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами при соблюдении правил отдельного приема.

Беременность и лактация

Нет ограничений в применении.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять автомобилем или потенциально опасными механизмами

Не влияет.

Форма выпуска и упаковка

Таблетки, 400 мг

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель/упаковщик

АО «АВВА РУС», Россия

610044, г. Киров, ул. Луганская, д. 53а.

Тел.: +7 (8332) 25-12-29; + 7 (495) 956-75-54.

avva.com.ru

filtrum.eu

Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения

АО «АВВА РУС», Россия.

Наименование, адрес и контактные данные организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:

ТОО «AVVA Kazakhstan», Республика Казахстан

050057, г. Алматы, ул. Бухар Жырау, д. 66/120, офис 101-2.

Тел.: 8 (727) 274-11-17.

e-mail: info@avva-rus.ru